

あせも



②紅色汗疹

角質層より下の表皮の汗管が詰まるタイプです。閉塞した汗管周辺には炎症が生じ、汗の成分が周辺組織に染み出することで、直径2ミリ程度の丘疹を形成します。

あせもの種類

汗疹とは、一般的に「あせも」と呼ばれるものです。大量の発汗によって生じ、小さな水疱や丘疹が多発します。

あせもの原因

汗は皮膚の中にある汗腺で生成され、細い管（汗管）を通って皮膚の表面に分泌されます。汗疹は、大量の発汗などによって汗管が詰まるところで、生成された汗が正常に分泌されず、皮下にたまることが原因となつて発



①水晶様汗疹

角質層や角質層直下の皮膚表層の汗管が詰まるタイプです。直径数ミリ程度の小

さな水疱を形成しますが、か

れども、汗疹は皮膚の中にある汗腺で生成され、細い管（汗管）を通って皮膚の表面に分泌されます。汗疹は、大量の発汗などによって汗管が詰まるところで、生成された汗が正常に分泌されず、皮下にたまることが原因となつて発

③深在性汗疹

角質層より下の表皮の汗管が詰まるタイプです。直径数ミリ程度の小

さな水疱を形成す



あせかぶれとは？

（主に熱帯地方でみられる症状です。）



あせもと間違われやすい疾患に「あせかぶれ」があります。汗をよくかく部位にブツブツができると「あせも」ができたと思われがちです

が、汗が刺激となつて搔いてしまい炎症を起こしたものによつて表皮と真皮の境界部付近の汗管が破壊されることがあります。汗疹を繰り返すことによつて表皮と真皮の境界部付近の汗管が破壊されると、あせもとは異なる疾患で

皮内に汗が貯留するため、炎症による発赤は皮膚表面からは見えませんが、白い扁平な丘疹を形成します。痒みはないものの、汗を排出できず体温調節機能が低下するため熱中症のリスクが上がりります。